

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае», г. Пермь,
ул. Куйбышева, 50 а**

Гигиеническое обучение

- гигиеническое обучение (сантехминимум) для работников общепита, торговли, коммунального и бытового обслуживания, туристических фирм, фармации, воспитателей и преподавателей, водителей автотранспортных средств и др.
- личные медицинские книжки (представить фото 3x4)
- санитарные правила, информационные материалы на электронном носителе по желанию заказчика.
- памятки для населения на безвозмездной основе.

**Консультационный центр
для потребителей**

- Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с покупкой некачественного товара или оказанием некачественной услуги.
- Санитарно-эпидемиологическая и товароведческая экспертиза некачественного товара или услуги.

Режим работы

Пн-Пт 9.00-16.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
Тел. 236-48-04

Пн-Пт 9.00-17.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
Тел. 236-48-77

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»**

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а
[www. 59fbuz.ru](http://www.59fbuz.ru)

Телефон: 236-48-04
Эл. почта: go-fgu@mail.ru



Отдел гигиенической подготовки

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Дифтерия



ПАМЯТКА
ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Дифтерия – это воздушно – капельная инфекция, вызываемая коринобактерией и характеризующаяся повышением температуры и появлением специфического налета в месте входных ворот возбудителя.

Устойчивость. Возбудитель дифтерии долго сохраняется во внешней среде (на поверхности предметов и в пыли – до 2 месяцев), при нагревании до 60°C гибнет через 10 минут. Губительное действие на возбудителя оказывают: ультрафиолетовые лучи и дезинфицирующие препараты.

Основным источником инфекции является больной человек или бактерионоситель.

Механизм передачи – аэрозольный, путь – воздушно-капельный, но в некоторых случаях факторами передачи могут стать грязные руки и объекты внешней среды (предметы обихода, игрушки, посуда, белье и др.). В редких случаях могут возникать пищевые вспышки, связанные с размножением возбудителя в молоке, кондитерских кремах.

Формы заболевания. В зависимости от того как проник возбудитель в организм человека, различают следующие формы заболевания: дифтерия ротоглотки, дифтерийный круп (дифтерия гортани, трахеи, бронхов), дифтерия носа, глаз, ушей, половых органов, кожи и комбинированные формы, сочетающие в себе поражение нескольких органов.

Чаще встречается дифтерия ротоглотки в локализованной форме. Заболевание

начинается остро, повышенная температура сохраняется в течение 2-3 дней. Отмечаются головная боль, недомогание, снижение аппетита, бледность кожи. При снижении температуры появляются боли в горле при глотании, покраснение и умеренный отек миндалин, мягкого неба и дужек. На миндалинах появляется налет, который на 2 сутки болезни становится плотным, гладким, сероватого цвета с перламутровым блеском и трудом снимается, на месте снятия слизистая оболочка начинает кровоточить. На месте удаленной пленки на следующий день образуется новая.

Течение заболевания, как правило, доброкачественное. После нормализации температуры тела уменьшается и исчезает боль в горле, но налет на миндалинах может сохраняться 6-8 дней.

Сравнительно редко встречается распространенная форма дифтерии ротоглотки, которая отличается тем, что налет распространяется за пределы миндалин на любые участки слизистой оболочки и симптомы заболевания носят более выраженный характер.

Осложнения. Время развития осложнений зависит от клинической формы и степени тяжести заболевания. Могут отмечаться поражения сердца, почек, печени, нервной системы.

Профилактика. Основным методом профилактики является вакцинация АКДС.

Сроки проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

| Возраст | Вид прививки |
|------------------------|---|
| 3 месяца | Первая прививка против дифтерии, коклюша, столбняка |
| 4,5 месяца | Вторая прививка против дифтерии, коклюша, столбняка |
| 6 месяцев | Третья прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка |
| 18 месяцев | Повторная прививка (ревакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка |
| 6-7 лет | Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка |
| 14 лет | Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка |
| Взрослые старше 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |

Помните! Если Вы почувствовали себя плохо, обратитесь за медицинской помощью. Самолечением не занимайтесь!